

# Øving 4

## Elektrisk potensial og Gauss' lov.

*Veiledning:* Torsdag 4. og fredag 5. feb. ifølge nettsider.

*Innlevering:* Tirsdag 9. feb. kl. 14:00


Lever øvinger i bokser utenfor R1.

### Oppgave 1. Flervalgsoppgaver.

(Eksamen har 30% flervalgsoppgaver. Der viser du ingen utregning/begrunnelse, men det kan du gjerne her.)

a) Figuren viser et uniformt elektrisk felt  $\vec{E}$  (heltrukne linjer). Langs hvilken stiplet linje endrer potensialet seg ikke?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E Endrer seg langs alle linjer 1,2,3 og 4



b) En partikkel med negativ ladning plasseres med null starthastighet i et elektrostatisk felt  $\vec{E}$ . Partikkelens bevegelse blir

- A i retning lavere potensial.
- B i retning lavere potensiell energi.
- C i samme retning som  $\vec{E}$ .
- D i retning normalt på  $\vec{E}$ .
- E i retning høyere potensiell energi.

c) Den potensielle energien til to elektroner i innbyrdes avstand  $1,0 \text{ \AA}$  ( $= 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ ) er [ $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ ]


- A  $2,3 \cdot 10^{-18} \text{ eV}$
- B  $1,4 \text{ neV}$
- C  $14 \text{ meV}$
- D  $14 \text{ eV}$
- E  $14 \text{ keV}$

d) En berylliumkjerne med ladning  $4e$  og masse  $9m_p$  og en  $\alpha$ -partikkel (dvs. en heliumkjerne) med ladning  $2e$  og masse  $4m_p$  er i ro. De to partiklene kan gis like stor hastighet ved å

- A akselerere dem over en like stor potensialforskjell.
- B akselerere  $\alpha$ -partikkelen over en potensialforskjell  $V$  og berylliumkjernen over  $V/2$ .
- C akselerere  $\alpha$ -partikkelen over en potensialforskjell  $V$  og berylliumkjernen over  $8V/9$ .
- D akselerere  $\alpha$ -partikkelen over en potensialforskjell  $V$  og berylliumkjernen over  $9V/8$ .
- E akselerere  $\alpha$ -partikkelen over en potensialforskjell  $V$  og berylliumkjernen over  $9V/4$ .

### Oppgave 2. Potensial rundt elektrisk dipol.

En elektrisk dipol som består av to punktladninger  $\pm q$ , er plassert langs  $z$ -aksen med sentrum i origo, som vist i figuren. Det elektriske *dipolmomentet* er da  $\vec{p} = q\vec{a}$ , der  $\vec{a} = a \hat{z}$  er vektoren fra  $-q$  til  $q$ .



Siden vi her opplagt må ha *symmetri* med hensyn til rotasjon omkring  $z$ -aksen, er det tilstrekkelig å se på forholdene i et halvplan som inneholder  $z$ -aksen, f.eks.  $xz$ -planet, med  $x > 0$ .

Vi kan videre velge mellom kartesiske koordinater  $(x, z)$  eller polarkoordinater  $(r, \theta)$  for å angi en vilkårlig posisjon i dette planet. Vi skal se på begge deler i denne oppgaven. Vinkelen  $\theta$  kan vi selvsagt velge i forhold til hvilken kartesiske akse vi vil; her lar vi  $\theta$  være vinkelen som  $\vec{r}$  danner i forhold til  $z$ -aksen (se figuren).

a) Bestem først sammenhengen mellom de kartesiske koordinatene og polarkoordinatene, dvs.  $x(r, \theta)$ ,  $z(r, \theta)$  og  $r(x, z)$ .

b) Vis at potensialet fra en slik dipol i kartesiske koordinater blir

$$V(x, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z - a/2)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z + a/2)^2}} \right).$$

c) Hva blir potensialet på  $x$ -aksen,  $V(x, 0)$ ? Enn på  $z$ -aksen,  $V(0, z)$ ? (På *hele*  $z$ -aksen; pass på fortegnene...!) Skisser funksjonen  $V(0, z)$ .

d) Vis at i stor avstand fra dipolen (dvs  $r \gg a$ ) er potensialet med god tilnærming gitt i polarkoordinater ved

$$V(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}.$$

TIPS: Ta utgangspunkt i at

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} = \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2},$$

og bruk figuren til å finne et tilnærmet uttrykk for dette når  $r \gg a$ .

Mens potensialet fra en enkelt punktladning avtar som  $1/r$ , avtar altså potensialet fra en dipol *raskere*, nemlig som  $1/r^2$ . Er dette rimelig?

### Oppgave 3. To kuleskall.

To svært tynne, konsentriske, metalliske kuleskall har radier henholdsvis  $R$  og  $\frac{3}{2}R$ . Det indre skallet har ladningen  $q$ , og det ytre skallet har ladningen  $-3q$ .

a) Finn uttrykk for det elektriske feltet  $\vec{E}(r)$  i alle deler av rommet.

b) Hva er potensialdifferansen mellom skallene?

c) Hvordan vil ladningen fordele seg dersom de to skallene forbindes med en tynn ledende tråd?

### Oppgave 4. Kule med gitt $Q(r)$ .

Ei kule med radius  $R$  har en ladningsfordeling slik at ladningen  $Q(r)$  innenfor radius  $r$  er gitt ved

$$Q(r) = 4\pi\rho_0 \left( \frac{4}{3}r^3 - \frac{1}{R}r^4 \right) \quad \text{for } r \leq R$$

Den totale ladningen for kula er således

$$Q_0 = Q(R) = \frac{4\pi}{3}R^3\rho_0,$$

hvor vi ser at  $\rho_0$  er gjennomsnittsverdien av  $\rho(r)$  i kula. Utenfor kula er det ladningsfritt.

a) Bestem det elektriske feltet utenfor kula ( $r > R$ ) og inne i kula ( $r \leq R$ ).

b) Bestem det elektriske potensialet  $V(r)$  utenfor kula og inne i kula. Sett referansepunktet ved  $r \rightarrow \infty$ , dvs.  $V(\infty) = 0$ .

c) Er potensialet kontinuerlig ved overflata av kula ( $r = R$ )?

d) Finn uttrykk for romladningstettheten  $\rho(r)$  for  $r \leq R$ .

---

Utvalgte fasitsvar:

3b)  $-q/(12\pi\epsilon_0 R)$ ,

4a)  $E(r < R) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} (4r - \frac{3}{R}r^2)$ , 4b)  $V(r < R) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} [2R^2 - 2r^2 + \frac{r^3}{R}]$ , 4d)  $4\rho_0 (1 - \frac{r}{R})$ .