



Kap. 14 Mekaniske svingninger

- **Mye svingning i dagliglivet:**

- Pendler
- Musikkinstrument
- Elektriske og magnetiske svingning
- Klokker
- Termiske vibrasjoner (= temperatur)
- Måner og planeter
- Historien og økonomien
- m.m.
- Farlige svingninger:



Tacoma Narrows Bridge on the morning of Nov. 7, 1940. The bridge was an unusually light design, and, as engineers discovered, peculiarly sensitive to high winds. Rather than resist them, as most bridges do, the Tacoma Narrows tended to sway and vibrate. On November 7, in a 40-mile-per-hour wind, the center span began to sway, then twist. The combined force of the winds and internal stress was too great for the bridge, and it self-destructed. No one was killed, as the bridge had been closed because of previous swaying. This is one of the best-known and most closely studied engineering failures, thanks in large part to the film and photographs that recorded the collapse. Full video: <http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxw>

Brusvinginger i Norge, «Lena», 9. aug. 2014

Tofterøybrua, Hordaland:

<http://www.nrk.no/hordaland/her-danser-broen-til-uværet-1.11873672>



14. Mekaniske svingninger

- **Vi skal se på:**

- 14.1-6. Udempet harmonisk svingning

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$
- 14.7. Dempet svingning


$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega_d t + \varphi)$$
- 14.8. Tvungen svingning (resonans)
- Eksempler:
 - **Fjærpendel**
 - Matematisk pendel
 - Fysisk pendel
- Y & F: Kap. 14 (mer enn pensum)
- L & L: Kap. 9 (mer enn pensum, spesielt å løse diff.likn.)
- H & S: Kap 6 (litt kortfattet)

Harmonisk oscillasjon (SHM = Simple Harmonic Motion)

Eks: Masse-fjær-pendel (friksjonsfri)

$$\text{Fjærkretter: } F_x = -k \Delta x$$

$$\text{Newton 2 gir: } d^2/dt^2 x + k/m x = 0 \quad (14.4)$$




Newton 2 gir:

$$d^2/dt^2 x + \omega_0^2 x = 0 \quad (14.4)$$

$$\text{der } \omega_0^2 = k/m \quad (14.10)$$

$$\text{løsning: } x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (14.13)$$




I romfartøy:
Tygden mangler.

Måling av masse
ved SHM:

$$m = k / \omega_0^2$$

Kjent k
Måler ω_0



Harmonisk svingning:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (14.13)$$

$$\text{startamplitude} = x_0 = x(t=0) = A \cos \varphi \quad (*)$$

$$\text{startfart} = v_0 = dx/dt(t=0) = -A \omega_0 \sin \varphi \quad (**)$$





gir:

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega_0}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega_0^2}$$

v_0	x_0	φ	A	$x(t)$
= 0	$\neq 0$	0	x_0	$x_0 \cos \omega_0 t$
$\neq 0$	= 0	$\pi/2$	v_0/ω_0	$v_0/\omega_0 \sin \omega_0 t$

Enkle
eksempler



Fra en eksamen (Fysmat des. 2009) (flervalgsoppgave)

- Ei pakke vaskemiddel står oppå en vaskemaskin som er i ferd med å centrifugere på 1200 omdreininger per minutt. Vaskemaskinen vibrerer dermed vertikalt med en amplitud på 1,0 mm. Vil vaskemiddelpakken på noe tidspunkt miste kontakten med underlaget? Hvorfor, evt. hvorfor ikke?

- A. Ja, fordi vaskemaskinenes maksimale akselerasjon overstiger $9,8 \text{ m/s}^2$.
 B. Ja, fordi vaskemaskinenes maksimale hastighet overstiger $9,8 \text{ m/s}$.
 C. Nei, fordi vaskemaskinenes maksimale akselerasjon aldri overstiger $9,8 \text{ m/s}^2$.
 D. Nei, fordi vaskemaskinenes maksimale hastighet aldri overstiger $9,8 \text{ m/s}$.
 E. Nei, fordi vaskemaskinenes maksimale vertikale utsving aldri overstiger $9,8 \text{ mm}$.


SHM:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1200/60 \text{ 1/s} = 40\pi \text{ 1/s}$$

$$x = A \cos(\omega t) \Rightarrow a = d^2x/dt^2 = -\omega^2 A \cos(\omega t)$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = (40\pi)^2 \cdot 0,001 \text{ m} = 15,8 \text{ m/s}^2 > g \Rightarrow \text{Alt. A}$$

Mulige svar



Matematisk pendel
(14.5 Simple pendulum)

For små utsving:
 $d^2/dt^2 \theta + \omega_0^2 \theta = 0$
 med
 $\omega_0^2 = g/L$ $T = 2\pi/\omega$

Større utsving:
 Ikke-harmonisk svingning
 Behandles numerisk
 (Matlab) i
 Øving 7, opg. 4.

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.
 (Y&F Fig. 14.21b)

Fra eksamen (Fysmat des. 2003) Horisontal svingning.

Oppgave 4

En pakke med masse m er plassert på en horisontal plattform som svinger harmonisk langs bakken med periode T . Friksjonskoeffisienten mellom pakken og plattformen er μ og tyngdens akselerasjon er g . Svingamplittuden A økes nå langsomt (med konstant T).

Ved hvilken amplitud A_0 begynner pakken å skli? (Forsøk med en mynt på et papirark.)


Friksjonsbegrenset

Pakken akselereres av friksjonskrafta som er max $F_f = \mu mg$,
 dvs. dens maksimale akselerasjon den kan følge er
 $a_{\max} = F_f/m = \mu g$.





Underlagets akselerasjon er
 $a = -\omega^2 A \cos(\omega t)$, dvs. amplitudeverdi $\omega^2 A = (2\pi/T)^2 A$
 Sammenholdt: $\mu g = (2\pi/T)^2 A$
 $\Rightarrow A_0 = \omega^2 A = \mu g (T/2\pi)^2$

Feil ved f.eks. 30° :

$$\begin{aligned} \sin 30^\circ &= \sin \pi/6 = 0,500 \\ \pi/6 &= 0,524 \\ \sin \theta &= \theta \text{ feil med } 5\% \end{aligned}$$




(Y&F Fig. 14.22)



14.8. Tvungen svingning. Resonans

Svingelikning:

$$d^2/dt^2 x + 2\gamma d/dt x + \omega_0^2 x = f_0 \cdot \cos \omega t$$



Etter kort tid bestemmer pådraget frekvensen:


$$x(t) = A_0 \cos(\omega t - \delta)$$

Amplitude A_0 og fase δ bestemmes av ω og γ :

$$A_0 = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} \quad (14.46)$$

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Resonans (stor A_0) når $\omega = \omega_0$




Figurer:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Vibration>

$$\zeta = \gamma/\omega_0$$

$$A_0 = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$



14. Mekaniske svingninger. Oppsummering 1


• Udempet harmonisk oscillasjon (SHM)

Kriterium SHM: Krafta som trekker mot likevekt

er prop. med avstand x (eks. $F = -kx$)

Dette gir fra Newton 2: $d^2/dt^2 x + \omega_0^2 x = 0$

med løsning: $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$



• masse/fjær: $\omega_0^2 = k/m$

• tyngependel (matematisk): $\omega_0^2 = g/l$


• fysisk pendel: $\omega_0^2 = mgl/I$

• Dempet harmonisk oscillasjon

$$d^2/dt^2 x + 2\gamma d/dt x + \omega_0^2 x = 0$$

med løsning: $x(t) = A e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega_d t + \phi)$

(svak demping $\gamma < \omega_0$) $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$



14. Mekaniske svingninger. Oppsummering 2

Tvungen svingning (resonans)


$$d^2/dt^2 x + 2\gamma d/dt x + \omega_0^2 x = F_0/m \cdot \cos \omega t$$

med løsning $x(t) = A_0 \cos(\omega t - \delta)$

$$A_0 = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Resonans (stor A_0) når $\omega = \omega_0$



Energi:

• Totalenergien $E_{tot} = E_k(t) + E_p(t)$ er konstant og svinger mellom $E_k(t)$ og $E_p(t)$

• $E_p(t)$ prop. med x^2 for alle svingninger

Fjærpendel: $E_p(t) = \frac{1}{2} k x^2$