

Veiledning: Man 27. okt. og ons 29. okt.

Innlevering: Torsdag 30. okt. kl. 12:00

Gruppeinndelingen finner du på emnets nettside.

Lever øvinger i bokser utenfor R1.

Oppgave 1.

Prøv å gjette hvor mye lufta i soverommet ditt veier. Foreta så en beregning.

Oppgave 2. Væsketilstand.

Finn ut omtrentlig hvor mye etanol du må ha i ”kula” nederst på et sprittermometer dersom 1,00 mm på søylen skal tilsvare 0,10 °C. Anta et sirkulært tverrsnitt på spritsøylen (som skal være synlig også for oss som har passert femti, la si f.eks. diameter 0,40 mm). Relativ volumøkning for etanol er 0,100 % når temperaturen øker med en grad, dvs. $\beta = \frac{\Delta V}{V} \frac{1}{\Delta T} = 0,00100 \text{ K}^{-1}$.

Oppgave 3. van der Waals tilstandslikning.

a. Beregn trykket p i $n = 1,00$ mol luft ved 20°C og volum 24,0 l når du antar at luft er en ideell gass. Finn p når gassen er komprimert til 0,24 l.

b. Når tettheten øker, vil luft avvike fra ideell gass. Da kan van der Waals' tilstandslikning benyttes som en bedre tilnærrelse:

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - bn) = nRT,$$

der a og b er konstanter¹. Hva blir trykket p for $n = 1,00$ mol luft ved de samme volum 24,0 l og 0,24 l når van der Waals' tilstandslikning brukes med verdier for luft $a = 1,368 \text{ bar}(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}})^2$ og $b = 0,0367 \text{ m}^3/\text{kmol}$?

OPPGITT: 1 kmol = 1000 mol; 1 bar = $1,000 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$.

Oppgave 4. Trening i første hovedsetning.


I et termodynamisk system foregår en tilstandsforandring fra A til B. Når prosessen følger vegen ACB (se figuren) opptar systemet 80 J varme samtidig som det utfører et arbeid på 30 J.

a. Hva er forskjell i indre energi U mellom tilstand A og B?

b. Hvor stor varmemengde Q_{ADB} mottar systemet dersom prosessen følger vegen AD når det utførte arbeid i dette tilfellet er 10 J?

c. Systemet går tilbake fra tilstand B til utgangspunkt A langs den krumme banen. Under denne prosessen utføres et arbeid 20 J på systemet. Vil systemet motta eller avgje varme under denne prosessen, og i tilfelle hvor mye?

d. Anta at de indre energiene i tilstandene A og D er henholdsvis $U_A = 80 \text{ J}$ og $U_D = 120 \text{ J}$. Finn de mottatte varmemengder Q_{AD} og Q_{DB} under prosessene AD og DB.

**Oppgave 5. Isotermt arbeid.**

To mol av en ideell gass er ved temperaturen 300 K. Gassen ekspanderer isotermt til to ganger sitt opprinnelige volum. Beregn arbeidet som gassen gjør, nødvendig varme tilført og endring i gassens indre energi.

Oppgave 6. Tilstandsdiagram og arbeid.

En ideell gass er innesluttet i enylinder med et tettsluttende stempel. Trykket er p_1 og volumet er V_1 . Gassen varmes først langsomt ved konstant volum slik at temperaturen dobles, deretter kjøles den ved konstant trykk inntil den har fått sin opprinnelige temperatur. Tegn inn prosessene i et pV -diagram og vis at arbeidet gjort på gassen er lik $p_1 V_1$.

¹Tiltrekkende kraft mellom molekylene er inkludert via konstanten a og volumet molekylene opptar inkludert ved konstanten b .

Oppgave 7. Flervalgsoppgaver.

a. To baller blir sluppet fra samme høyde 6,0 m. Ball A spretter opp til en høyde 4,0 m mens ball B spretter opp til 2,0 m. Hvilken ball mottar det største kraftstøtet (får størst endring i bevegelsesmengden) i løpet av kollisjonen mot golvet? Se bort fra luftmotstand.

- A) ball A
- B) ball B
- C) De får begge samme kraftstøt
- D) Umulig å vite uten å vite massen til ballene.
- E) Umulig å vite uten å vite lengden på kollisjonen.

b. En *horizontal* kraft \vec{F} blir brukt for å skyve en gjenstand med masse m oppover et skråplan. Vinkelen mellom skråplanet og horisontalplanet er θ . Normalkrafter som virker fra skråplanet på massen m har størrelse:


- A) $mg \cos \theta + F \cos \theta$
- B) $mg \cos \theta$
- C) $mg \cos \theta + F \sin \theta$
- D) $mg \cos \theta - F \cos \theta$
- E) Umulig å bestemme uten å vite friksjonskoeffisient og/eller akselerasjon.

c. Hvis α er den lineære varmeutvidelseskoeffisienten til et materiale ved 0°C , så er volumutvidelseskoeffisienten til materialet ved 0°C lik

- A) α
- B) 3α
- C) α^3
- D) $\alpha^{1/3}$
- E) Ingen av svarene over er rett

d. Varme tilføres et rent stoff i en lukket beholder. Tilført varme per tidsenhet er konstant. Figuren viser hvordan stoffets temperatur T endrer seg med tiden. Hva er forholdet mellom stoffets smeltevarme L_s og stoffets fordampningsvarme L_f ?

- A) $L_s/L_f = 0,33$
- B) $L_s/L_f = 0,60$
- C) $L_s/L_f = 0,88$
- D) $L_s/L_f = 1,00$
- E) $L_s/L_f = 1,67$



Utvalgte fasitsvar:

2: 1,3 ml; 3b: 1,00 atm, 94,6 atm; 4d: 50 J, 10 J; 5: 3,46 kJ.